

GRUPO Y FACTOR RH SANGUINEO**GRUPO SANGUINEO**

METODO: Aglutinación ABO

FACTOR Rh - Anti D

METODO: Mezcla de Ac. Monoclonales IgG/IgM (BLEND)

" O "

Positivo

GLUCEMIA

METODO: Colorimétrico

0,95 g/l

0,70 a 1,00 g/l

UREMIA

METODO: Cinético UV optimizado

0,41 g/l

0,10 a 0,50 g/l

HEPATOGRAMA**COLESTEROL TOTAL**

METODO: Cinético colesterol esterasa-oxidasa

204 mg/dl

Según NCEP:

Deseable: menor a 200 mg/dl

Limite: 200 - 240 mg/dl

Alto: mayor a 240 mg/dl

ASPARTATOAMINOTRANSFERASA - AST - TGO

METODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

50 U/l

Masculino Hasta 38 U/l

Femenino Hasta 32 U/l

ALANINOAMINOTRANSFERASA - ALT - TGP

METODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

76 U/l

FOSFATASA ALCALINA

METODO: Cinético optimizado (DGKC y SSCC)

109 U/l

BILIRRUBINA TOTAL

METODO: Colorimétrico - DPD

0,67 mg/dl

Hasta 1,00 mg/dl

BILIRRUBINA DIRECTA

METODO: Colorimétrico - DPD

0,05 mg/dl

Hasta 0,30 mg/dl

BILIRRUBINA INDIRECTA

METODO: Cálculo

0,62 mg/dl

Hasta 0,70 mg/dl

COLESTEROL HDL

METODO: Colorimétrico enzimático homogéneo

54 mg/dl

40 a 120 mg/dl

COLESTEROL LDL

METODO: Colorimétrico enzimático homogéneo

150 mg/dl


Valores guía para evaluar riesgo de cardiopatía coronaria en adulto:

Óptimo: menor 100 mg/dl

Límite: 100 - 159 mg/dl

Alto: 160 - 189 mg/dl

Muy alto: mayor o igual 190 mg/dl



Dr Varesco Andres Ricardo
Bióquimico
MP 443