

GRUPO Y FACTOR RH SANGUINEO**GRUPO SANGUINEO**

" O "

METODO: Aglutinación ABO

FACTOR Rh - Anti D

Positivo

METODO: Mezcla de Ac. Monoclonales IgG/IgM (BLEND)

GLUCEMIA

0,94 g/l

0,70 a 1,00 g/l

METODO: Colorimétrico

UREMIA

0,36 g/l

0,10 a 0,50 g/l

METODO: Cinético UV optimizado

HEPATOGRAMA**COLESTEROL TOTAL**

202 mg/dl

Según NCEP:

Deseable: menor a 200 mg/dl

Limite: 200 - 240 mg/dl

Alto: mayor a 240 mg/dl

METODO: Cinético colesterol esterasa-oxidasa

ASPARTATOAMINOTRANSFERASA - AST - TGO

22 U/l

Hasta 38 U/l

METODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

ALANINOAMINOTRANSFERASA - ALT - TGP

21 U/l

Hasta 40 U/l

METODO: Cinético UV 37 °C optimizado - IFCC

FOSFATASA ALCALINA

74 U/l

65 a 300 U/l

METODO: Cinético optimizado (DGKC y SSCC)

BILIRRUBINA TOTAL

0,69 mg/dl

Hasta 1,00 mg/dl

METODO: Colorimétrico - DPD

BILIRRUBINA DIRECTA

0,05 mg/dl

Hasta 0,30 mg/dl

METODO: Colorimétrico - DPD

BILIRRUBINA INDIRECTA

0,64 mg/dl

Hasta 0,70 mg/dl

METODO: Cálculo

COLESTEROL HDL

46 mg/dl

40 a 120 mg/dl

METODO: Colorimétrico enzimático homogéneo

COLESTEROL LDL

141 mg/dl

Valores guía para evaluar riesgo de cardiopatía coronaria en adulto:


Óptimo: menor 100 mg/dl

Límite: 100 - 159 mg/dl

Alto: 160 - 189 mg/dl

Muy alto: mayor o igual 190 mg/dl

METODO: Colorimétrico enzimático homogéneo



Dr. Varesco Andres Ricardo
Biogénico
MP 443